



ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

ΥΓΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΕ ΛΑΧΑΝΟΜΙΚΑ

Τοποθεσία:	Ινστιτούτο Λαχανοκομίας στο Buzau της Ρουμανίας, το οποίο είναι το Αγρόκτημα του πανεπιστημίου, της Γεωπονικής Σχολής του Βουκουρεστίου.
Καλλιέργειες:	Σε όλα τα Λαχανοκομικά
Μεταφύτευση:	Μάιος 2017
Έκταση/Χώρος:	500-1000 m ² σε θερμοκήπιο και 500-1000 m ² στον αγρό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στα πειράματα που ακολουθούν έχει γίνει χρήση λιπασμάτων που περιέχουν χαλκό, οργανικό ασβέστιο, οργανικά φυτικά εκχυλίσματα και άζωτο **χωρίς** νιτρικά ή αμμωνιακά ιόντα τα οποία παραχωρήθηκαν από την εταιρεία υγρών λιπασμάτων ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ. Η φυτοπροστασία καθώς και η χορήγηση στα φυτά στοιχείων όπως το κάλιο, ο φώσφορος, το μαγνήσιο και τα ιχνοστοιχεία υπόκεινται καθαρά στη κρίση της επιστημονικής ομάδας του ινστιτούτου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

Ψεκασμός
1^η Εφαρμογή

Μετά τη μεταφύτευση

THEOHEALTH	500ml / 100Kg Νερό / 1000 m ²	και
THEOFAST	200ml / 100Kg Νερό / 1000 m ²	και
THEOBORO	50ml / 100Kg Νερό / 1000 m ²	και
THEOCAL	50gr / 100Kg Νερό / 1000 m ²	

Ψεκασμός
Επόμενη Εφαρμογή

Κάθε 2 εβδομάδες

THEOHEALTH	500ml / 100Kg Νερό / 1000 m ²	και
THEOFAST	200ml / 100Kg Νερό / 1000 m ²	και
THEOBORO	50ml / 100Kg Νερό / 1000 m ²	και
THEOCAL	50gr / 100Kg Νερό / 1000 m ²	



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΡΙΖΟΠΟΤΙΣΜΑ (ΣΤΑΓΟΝΑ)

Από το έδαφος
μετά το πότισμα

1^η Εφαρμογή

Μετά τη μεταφύτευση

THEOMIN 1ml / Φυτό

Από το έδαφος
μετά το πότισμα

2^η Εφαρμογή

Μετά από 2-3 εβδομάδες

THEOCOPPER 1ml / Φυτό και
THEOCAL 1gr / Φυτό



Ομοιόμορφη καρποφορία και μέγεθος



ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΜΑΤΑ

ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΤΟΜΑΤΑ

Ανάλογα το στάδιο ανάπτυξης
των φυτών,
τις κλιματολογικές συνθήκες
και τη συχνότητα εμφάνισης των παθογόνων

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές
συνδυασμού των σκευασμάτων,
χρησιμοποιώντας τα υγρά λιπάσματα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ.

Επιπλέον θα μπορούσε να αυξηθεί η συχνότητα
των ψεκασμών κάθε 7-10 μέρες.

Όλες οι δοσολογίες ισχύουν για διάλυση σε 100 Kg νερό
Και συχνότητα ψεκασμών **ΚΑΘΕ 7-10 Μέρες**

Εφαρμογή Βασική Με ψεκασμό	Εφαρμογή Με συννεφιασμένο καιρό Με ψεκασμό	Εφαρμογή Για προστασία από μυκητολογικές μολύνσεις Με ψεκασμό
<p>THEORUN 500 ml THEOFAST 400 ml THEOBORO 50 ml THEOCAL 50 gr 9-15-27 + Mg + Ιχνοστοιχεία 250 gr</p>	<p>THEOHEALTH 500 ml THEOFAST 400 ml THEOBORO 50 ml THEOCAL 50 gr 9-15-27 + Mg + Ιχνοστοιχεία 250 gr</p>	<p>THEOCOPPER 500 ml THEOFAST 400 ml THEOBORO 50 ml THEOCAL 50 gr 9-15-27 + Mg + Ιχνοστοιχεία 250 gr</p>

<p>Εφαρμογή THEOMASS <u>Από το έδαφος μετά το πότισμα</u> Δόση: 2ml / φυτό</p> <p>Εφαρμογή 15-20 μέρες πριν τη συγκομιδή Εξαιρετικά αποτελέσματα στη Τομάτα (δε γνωρίζουμε ακόμα για άλλα λαχανοκομικά) Αποτελέσματα: οι καρποί γίνονται πιο σαρκώδεις, καλύτερο σχηματισμό και καρπόδεση των επόμενων ταξιανθιών. Παρουσιάζει αύξηση της παραγωγής της τάξεως του 20%</p>	<p>Εφαρμογή THEOVITA <u>Από το έδαφος μετά το πότισμα</u> Δόση: 2ml / φυτό</p> <p>Εφαρμογή 20-30 μέρες πριν τη συγκομιδή Συνιστάτε : Για πρώιμη συγκομιδή Για συννεφιασμένο καιρό</p> <p>Εφαρμογή THEOCOPPER THEOCAL <u>Από το έδαφος μετά το πότισμα</u> Εφαρμογή 20-30 μέρες \ για παθογόνα εδάφους THEOCOPPER 1-2 ml / φυτό και THEOCAL 1gr / φυτό</p>	<p>Εφαρμογή THEOCAL Για φυτά Τομάτας η δόση μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 125 gr</p> <p>Εφαρμογή THEOZINC Με ψεκασμό κάθε 20 μέρες Εφαρμογή με THEOZINC 100 ml THEOFAST 400 ml</p> <p>Είναι πολύ σημαντικό για τον καλύτερο σχηματισμό των ανθέων και των ταξιανθιών.</p>
--	--	---

